

Ricerca sangue occulto su tre campioni

La raccolta del campione deve essere eseguita utilizzando l'apposito **contenitore con conservante**.

E' possibile **ritirare il contenitore presso il Punto Prelievi in IEO**.

Non effettuare la raccolta del campione durante o entro 3 giorni del ciclo mestruale e/o mentre si è affetti da emorroidi sanguinanti.

Evitare di contaminare le feci con le urine.

Alcol, aspirina e altri medicinali assunti in eccesso possono causare irritazione gastrointestinali che provocano sanguinamento occulto. Queste sostanze dovrebbero essere sospese almeno 48 ore prima del test.


Non è necessaria alcuna restrizione alimentare prima di effettuare il test.

Modalità di prelievo

- Raccogliere in 3 giorni differenti una piccola quantità di feci ed immetterla in 3 diversi contenitori nel seguente modo:
 - Togliere il tappo verde del contenitore svitandolo e tirandolo verso l'alto
 - Prelevare il campione di feci con la sonda di campionamento sfregando in 5-6 diverse aeree della superficie delle feci. Prelevare una quantità sufficiente in modo da coprire la spirale della sonda
 - Inserire la sonda di campionamento nel contenitore (non ripetere questa operazione più di una volta), avvitare il tappo verde e agitare energicamente il contenitore diverse volte

Nota: In caso di feci dure, inumidirle con acqua prima di prelevare il campione con la sonda di campionamento

- I campioni così prelevati devono essere conservati in frigorifero e consegnati preferibilmente entro le 24 ore dalla raccolta e comunque non oltre i 3 giorni.



Il sottoscritto (cognome e nome) _____ dichiara di aver seguito le indicazioni proposte in questa informativa.

Data ____/____/____ Firma _____