

Modalità raccolta escreato

In assenza di specifica richiesta del medico curante, si consiglia di non effettuare l'esame in corso di terapia antibiotica.

Far trascorrere almeno 7 giorni dall'ultima assunzione di antibiotico.

- Utilizzare recipienti sterili a bocca larga con tappo a vite.
- Raccogliere il materiale al mattino a digiuno
- Effettuare una adeguata pulizia del cavo orale con collutori o gargarismi con soluzione fisiologica o distillata sterile
- Raccogliere direttamente nel recipiente almeno 2 ml di secreto proveniente dalla trachea emesso per espettorazione spontanea, con atti respiratori forzati o con colpi di tosse profondi
- L'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree e non deve essere contaminato da saliva.
- Nel caso ci sia difficoltà ad espettorare si può indurre la tosse con aerosol con soluzione fisiologica tiepida o con N-acetil-L-cisteina (non antibiotato).
- Consegnare subito in ambulatorio o conservare in frigorifero per al massimo 1 ora
- Per la ricerca del **Bacillo di Kock** è opportuno eseguire la raccolta **per 3 giorni consecutivi**.

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ dichiara di aver seguito le indicazioni proposte in questa informativa.

Data ____/____/____ Firma _____