



I NON FUMATORI

L'84,2% dei non fumatori dichiara di non avere mai fumato perché non ha mai sentito il bisogno. Gli altri, per motivi legati al proprio benessere fisico. La situazione è analoga nei tre luoghi di rilevazione e non cambia in base ai diversi parametri esaminati (sesso ed età) (fig. 1).

IL PROBLEMA DEL FUMO PASSIVO

Il fumo passivo rappresenta un problema per 2 non fumatori su 3 (fig. 2). Tale problema sembra essere avvertito in misura minore in IEO rispetto agli altri due luoghi di rilevazione (55% contro 93% e 86% di Eurisko e Novartis, rispettivamente). È evidente la gravità del problema per chi non fuma in Eurisko e Novartis, mentre in IEO, nonostante sia un ospedale senza fumo, quello passivo continua a rappresentare un problema per molti non fumatori (fig. 3).

PERCEZIONE DEL PROBLEMA FUMO PASSIVO E VARIABILI PERSONALI

I maschi e i giovani riferiscono di trovare il fumo passivo un problema, con frequenza inferiore

rispetto alle donne e ai soggetti più anziani (fig. 4, 5).

PERCEZIONE DEL PROBLEMA FUMO PASSIVO IN BASE ALL'ESPOSIZIONE

La percezione cambia notevolmente in relazione all'esposizione al fumo passivo: il 52% dei non esposti non lo ritiene un problema, al contrario lo è per tutte le persone esposte per 4 ore o più (fig. 6).

Sembrerebbe che per i non fumatori il divieto del fumo riduca la percezione soggettiva del fumo passivo come un problema. Più persone in IEO, dove l'esposizione è minore, ritengono questo problema non rilevante o importante per loro. La percezione del fumo passivo, tuttavia, come un problema anche tra i non esposti denota che esso ha acquisito ormai precise valenze sociali e non solo soggettive. Inoltre, risulta evidente che la problematicità del fumo passivo assume una intensità diversa in base al grado di esposizione. Il fumo passivo è un problema per:

- il 48% dei non esposti;
- il 95% delle persone esposte da 1 a 4 ore;
- il 100% delle persone esposte per oltre 4 ore.



MOTIVI PER NON AVERE MAI FUMATO (BASE 297 NON FUMATORI)




Figura 1

PERCEZIONE DEL PROBLEMA DEL FUMO PASSIVO (BASE 297)




Figura 2



PERCEZIONE DEL PROBLEMA DEL FUMO PASSIVO IN BASE AL LUOGO DI RILEVAZIONE (BASE 297)




Figura 3

PERCEZIONE DEL PROBLEMA DEL FUMO PASSIVO IN BASE AL SESSO (BASE 297)




Figura 4



PERCEZIONE DEL PROBLEMA DEL FUMO PASSIVO IN BASE ALLE FASCE DI ETÀ (BASE 297)




Figura 5

PERCEZIONE DEL PROBLEMA DEL FUMO PASSIVO IN BASE ALLE ORE DI ESPOSIZIONE AL FUMO (BASE 297)




Figura 6