

Modalità raccolta Escreato

In assenza di specifica richiesta del medico curante, si consiglia di non effettuare l'esame in corso di terapia antibiotica.

Far trascorrere almeno 7 giorni dall'ultima assunzione di antibiotico.

- Utilizzare recipienti sterili a bocca larga con tappo a vite.
- Raccogliere il materiale al mattino a digiuno.
- Procedere ad una adeguata pulizia del cavo orale ed effettuare dei gargarismi con acqua.
- Raccogliere il campione direttamente nel recipiente. Sono necessari almeno 2 ml di secreto proveniente dalla trachea emesso per espettorazione spontanea, con atti respiratori forzati o con colpi di tosse profondi.
- L'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree e non deve essere contaminato da saliva. Campioni costituiti da abbondante materiale salivare non sono considerati idonei.
- Nel caso ci sia difficoltà ad espettorare si può indurre la tosse con aerosol con soluzione salina tiepida o con N-acetil-L-cisteina (non antibiotato).
- Consegnare subito in ambulatorio o conservare in frigorifero per al massimo 1 ora.

Note particolari: la raccolta di un solo campione è di norma sufficiente per polmoniti di tipo batterico.

Nel sospetto di forme tubercolari, è opportuno eseguire la raccolta per la ricerca del Bacillo di Kock **per 3 giorni consecutivi.**

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ dichiara di aver
seguito le indicazioni proposte in questa informativa.

Data ____/____/____ Firma _____