

Comitato Etico degli IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino

RIUNIONE DEL 25/02/2015

Studio	Titolo	PI	Promotore
IEO 66	Studio prospettico internazionale osservazionale di coorte non comparativo sulla sicurezza e l'efficacia di Zaltrap somministrato in combinazione con FOLFIRI per il trattamento, nella normale pratica clinica, di pazienti con tumore del colon retto metastatico: studio post autorizzativo sulla sicurezza. PASS. OBS13597 - OZONE9948.	Zampino	Sanofi
IEO 173	Nuova tecnica di valutazione oggettiva del linfedema all'arto superiore nelle pazienti che hanno subito intervento di biopsia del linfonodo sentinella	Garusi	IEO
IEO 209	Standardizzazione della mobilitazione delle pazienti dopo intervento chirurgico senologico: studio clinico controllato e randomizzato.	Bucci	IEO
IEO 173	Nuova tecnica di valutazione oggettiva del linfedema all'arto superiore nelle pazienti che hanno subito intervento di biopsia del linfonodo sentinella	Garusi	IEO
IEO 224	Studio prospettico di fase III in doppio cieco controllato con placebo, randomizzato, dell'adiuvante MEDI4736 nel tumore al polmone on a piccole cellule completamente asportato. BR.31	De Marinis	Clinipace Global
IEO 225	Carcinoma della lingua: stratificazione della prognosi secondo classi di età.	Calabrese	IEO
IEO 229	Factors Influencing Quality of Life in patients undergoing stem cell mobilisation	Babic	IEO
IEO 232	Studio strategico Erbitux sul carcinoma coloretale metastatico: studio di fase III randomizzato a due bracci di trattamento con FOLFIRI + Cetuximab fino a progressione della malattia rispetto a FOLFIRI + Cetuximab per 8 cicli seguiti solo da Cetuximab fino a progressione della malattia, trattamento di prima linea in pazienti con cancro coloretale metastatico (mCRC) di tipo RAS e BRAF non mutato. ERMES	Fazio	Policlinico Gemelli RM
IEO 234	Studio di fase II multicentrico in aperto, a cinque bracci per valutare l'efficacia e la sicurezza dell'impiego del trattamento con ceritinib, somministrato per via orale, in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule ALK positivo, con metastasi cerebrali e/o leptomeningee. CLDK378A2205	De Marinis	Novartis
IEO 235	Studio di fase I/II multicentrico in aperto con CLR457 somministrato per via orale in pazienti adulti con tumori solidi in stadio avanzato. CCLR457X2101	Curigliano	Novartis
IEO 236	Studio di fase III randomizzato in doppio cieco controllato vs placebo con LEE011 o placebo in associazione a tamoxifene e goserelin o un inibitore dell'aromatasi non steroideo (NSAI) e goserelin per il trattamento delle donne in pre-menopausa con carcinoma mammario positivo per il recettore ormonale HER2-negativo in stadio avanzato.	Colleoni	Novartis
IEO 237	Studio di fase III in doppio cieco, controllato con placebo, randomizzato, con taselisib più fulvestrant rispetto a placebo più Fulvestrant in donne in postmenopausa con carcinoma mammario positivo per i recettori degli estrogeni e HER2-negativo, localmente avanzato o metastatico, andate incontro a recidiva o a progressione della malattia durante o dopo la terapia degli inibitori dell'aromatasi. GO29058	Colleoni	Roche
IEO 238	Metastasi ossee nei tumori neuroendocrini: storia naturale, impatto prognostico e approccio terapeutico	Frezza	IEO
IEO 239	200984: Studio in doppio cieco, randomizzato, di fase III per valutare l'efficacia e la sicurezza di pazopanib in monoterapia più la miglior terapia di supporto (MTS) rispetto a placebo più MTS in soggetti con tumori neuroendocrini pancreatici (TNEP) localmente avanzati o metastatici, ben differenziati, non resecabili, che siano progrediti durante o dopo il precedente trattamento con everolimus e/o sunitinib	Fazio	GSK